

MuscorigiDol

180 mg CEROTTO MEDICATO

Diclofenac epolamina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è MUSCORIDOL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MUSCORIDOL
3. Come usare MUSCORIDOL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUSCORIDOL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è MUSCORIDOL e a cosa serve

MUSCORIDOL appartiene a un gruppo di medicinali chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

I FANS riducono il dolore e l'infiammazione.

MUSCORIDOL è usato per alleviare il dolore e l'infiammazione di origine reumatica o traumatica di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento con MUSCORIDOL.

2. Cosa deve sapere prima di usare MUSCORIDOL

Non usi MUSCORIDOL:

- se è allergico a diclofenac, acido acetilsalicilico (aspirina), ad altri antidolorifici, qualsiasi altro FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha avuto asma, problemi respiratori, eruzione cutanea o naso che cola, a seguito dell'assunzione di acido acetilsalicilico (aspirina) o altri FANS;
- se è negli ultimi tre mesi di gravidanza (vedere paragrafo "Gravidanza, allattamento e fertilità");
- se attualmente soffre di ulcera allo stomaco (ulcera peptica);
- se ha la pelle lesionata, incluse zone essudanti o infette, eczema, ustioni o ferite;
- se il soggetto da trattare è un bambino o un adolescente di età inferiore ai 16 anni.

Informi il medico o il farmacista se una delle condizioni sopradescritte si applica al suo caso.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MUSCORIDOL se:

- soffre di malattie cardiache;
- soffre di malattie renali;
- soffre di malattie epatiche;
- ha avuto ulcere gastriche in passato;
- ha una malattia infiammatoria intestinale come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa o è predisposto ad episodi di sanguinamento intestinale;
- ha l'asma;
- ha avuto problemi respiratori, eruzioni cutanee o naso che cola dopo aver preso acido acetilsalicilico (aspirina) o altri FANS;
- sta assumendo diclofenac o altri FANS, come preparazione orale o topica;
- usa regolarmente lampade abbronzanti o si espone alla luce solare diretta (vedere anche paragrafo "Altre informazioni importanti");
- è anziano, poiché è più suscettibile all'insorgenza di effetti indesiderati.

Altre informazioni importanti

Usi sempre la dose efficace più bassa di MUSCORIDOL e per il minor tempo possibile per tenere sotto controllo i sintomi.

MUSCORIDOL deve essere utilizzato con cautela nei pazienti anziani che possono essere più facilmente soggetti a manifestare effetti indesiderati.

Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo usando la minima dose efficace per la minima durata necessaria. Non ecceda con la dose di MUSCORIDOL, non lo applichi su aree estese della pelle e non lo usi per lunghi periodi.

Non si esponga alla luce solare diretta o alla luce delle lampade solari (lampade abbronzanti), per almeno un giorno dopo aver tolto il cerotto; questo diminuirà il rischio di manifestare una reazione avversa alla luce (fotosensibilità).

Come altri medicinali per uso locale (topico), soprattutto in caso di terapia prolungata, MUSCORIDOL può provocare arrossamento e prurito (fenomeni di sensibilizzazione). Interrompa

il trattamento e si rivolga al medico o al farmacista, se usando questo cerotto si verificano reazioni della pelle nel sito di applicazione.

Bambini e adolescenti

Non applicare il cerotto ai bambini e agli adolescenti di età inferiore a 16 anni.

Altri medicinali e MUSCORIDOL

Se MUSCORIDOL viene utilizzato correttamente, il rischio di interazioni con altri medicinali è molto basso.

Tuttavia, informi il medico o il farmacista se sta usando, se ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. In particolare, informi il medico se sta assumendo altri farmaci contenenti diclofenac o altri FANS.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Non usi MUSCORIDOL se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Non usi MUSCORIDOL durante i primi 6 mesi di gravidanza se non strettamente necessario e su indicazione del medico. In caso di necessità di trattamento durante tale periodo, deve essere usata la dose più bassa per il tempo più breve possibile.

Le forme orali (ad es. compresse) di diclofenac possono causare effetti avversi nel nascituro. Non è noto se lo stesso rischio si presenti con MUSCORIDOL quando viene utilizzato sulla pelle.

Allattamento

MUSCORIDOL deve essere usato sotto consiglio medico durante l'allattamento con latte materno poiché il diclofenac passa nel latte materno in piccole quantità. Tuttavia, MUSCORIDOL non deve essere applicato sul seno della madre in allattamento né altrove su aree estese della pelle o per un periodo di tempo prolungato.

Consulti il medico o il farmacista per ulteriori informazioni in caso di gravidanza o allattamento con latte materno.

Fertilità

Se ha problemi di concepimento e sta usando MUSCORIDOL, informi il medico, poiché potrebbe essere opportuna la sospensione del trattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Il cerotto medicato di diclofenac non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

MUSCORIDOL contiene:

- conservanti quali **paraidrossibenzoati** (metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate);
- 420 mg di **glicole propilenico** per cerotto;
- **polisorbato 80** che può provocare reazioni allergiche.

3. Come usare MUSCORIDOL

Usi MUSCORIDOL seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e adolescenti di età pari o superiore a 16 anni

Quanti cerotti usare

La dose raccomandata di MUSCORIDOL è di un (1) cerotto nella zona più dolorosa una o due volte al giorno (una applicazione ogni 12 o 24 ore) per un massimo di 14 giorni consecutivi. Se durante il periodo di trattamento raccomandato non notasse alcun miglioramento o i sintomi peggiorassero, consulti il medico.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 14 giorni di trattamento.


Uso in bambini e negli adolescenti sotto i 16 anni di età

Non usi MUSCORIDOL su bambini o adolescenti al di sotto dei 16 anni di età. Non sono disponibili dati sull'efficacia e la sicurezza nei bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni (vedere paragrafo "Non usare MUSCORIDOL").


Negli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni, se i sintomi peggiorano, si consiglia al paziente/genitori dell'adolescente di consultare un medico. Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni di trattamento.

Come applicare MUSCORIDOL


Tagli la parte superiore della busta richiudibile ed estraiga un cerotto.



Richiuda con cura la busta.



Rimuova lo strato di plastica a protezione del lato adesivo del cerotto.




Applichi il cerotto sull'area della pelle gonfia o dove accusa dolore.



- Se necessario, il cerotto può essere tenuto in posizione con una fasciatura di garza a trama larga, o sottili strisce di nastro adesivo. Questi possono essere forniti dal vostro farmacista.
- Non coprire il cerotto con altri tipi di medicazione.
- Non coprire l'area medicata con materiale plastico o bendaggio che non lascia passare l'aria (bendaggio occlusivo).
- Il cerotto medicato deve essere applicato solo sulla cute integra e non danneggiata, evitandone l'applicazione su lesioni o ferite aperte. Il cerotto non deve essere utilizzato durante il bagno o la doccia.
- Fare attenzione a tenere il cerotto lontano da occhi, naso, bocca, aree genitali e anali.
- Se il cerotto viene a contatto con queste aree, risciacquare con acqua.
- Il cerotto non deve essere tagliato.

Sostituzione del cerotto



- Rimuova il cerotto ogni 12 o 24 ore e ne applichi uno nuovo.

Se dimentica di usare MUSCORIDOL

Non applichi un cerotto aggiuntivo per compensare la dimenticanza. Semplicemente applichi il successivo come previsto.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati **comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 10)

- Eruzioni ed arrossamento della pelle (eruzione cutanea, eczema, eritema), infiammazione della pelle (dermatite, inclusa dermatite allergica e da contatto), prurito o altre reazioni nel sito di applicazione del cerotto.

Effetti indesiderati **non comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Piccole macchie di colore rosso o viola sotto la pelle (petecchie);
- sensazione di caldo.

Effetti indesiderati **rari** (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Infiammazione della pelle con formazione di bolle (dermatite bollosa);
- pelle secca e squamosa.

Effetti indesiderati **molto rari** (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Infiammazione della pelle con presenza di pus (rash con pustole);
- sintomi da reazione allergica (ipersensibilità e reazione anafilattica), inclusa orticaria, gonfiore del viso (angioedema), delle labbra, degli occhi o della lingua e difficoltà respiratoria;
- asma;
- eruzioni cutanee peggiorate dalla luce solare (reazione di fotosensibilità).

Effetti indesiderati con frequenza **non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Sensazione di bruciore in sede di applicazione.

Poiché MUSCORIDOL viene applicato sulla pelle sopra l'area interessata, c'è un rischio minore di manifestare effetti indesiderati, come problemi di stomaco tra cui dolore, indigestione o qualsiasi segno di sanguinamento nello stomaco o nell'intestino, che possono verificarsi quando diclofenac è assunto per via orale. Tuttavia, se MUSCORIDOL non viene usato correttamente, possono verificarsi questi effetti indesiderati.

L'uso del medicinale in combinazione con altri farmaci contenenti diclofenac deve essere evitato perché se i cerotti medicati vengono utilizzati in associazione con altri medicinali contenenti diclofenac, aumenta la probabilità che si verifichino reazioni alla pelle, incluse quelle dopo esposizione al sole, come formazione di vescicole, eritema ed eczema. In rari casi possono comparire reazioni anche gravi, quali eruzioni cutanee con arrossamento, formazione di bolle ed esfoliazione (esempio Sindrome di Steven-Johnson, sindrome di Lyell).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare MUSCORIDOL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla busta e sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Non usi dopo 4 mesi dalla prima apertura della busta. Dopo aver estratto ogni cerotto, si assicuri che la busta sia stata richiusa di nuovo.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MUSCORIDOL

- Il principio attivo è diclofenac epolamina. Ogni cerotto medicato contiene un totale di 180 mg di diclofenac epolamina, corrispondenti a 140 mg di diclofenac sodico.

- Gli altri componenti sono gelatina, povidone (K90), sorbitolo liquido (non cristallizzabile), caolino pesante, titanio diossido (E171), glicole propilenico (E1520), metile paradiossibenzoato (E218), propile paradiossibenzoato (E216), disodio edetato (E385), acido tartarico, alluminio glicinato, carmellosa sodica, poliacrilato sodico, 1,3-butilenglicole, polisorbato 80 (E433), acqua depurata.

Lo strato di supporto tessuto-non tessuto è in poliestere.

Lo strato protettivo rimovibile è in polipropilene.

Descrizione dell'aspetto di MUSCORIDOL e contenuto della confezione

Ogni cerotto medicato si compone di una benda impregnata di una pasta di colore da bianco a giallo pallido, con lo strato adesivo protetto da un supporto di plastica trasparente rimovibile. Le buste richiudibili contengono 5 cerotti.

MUSCORIDOL è disponibile in confezioni da 5 o 10 cerotti per scatola.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Miat S.p.A.
Via Luigi Federico Menabrea, 20
20159 Milano (Italia)

Concessionario di vendita

DOC Generici S.r.l.
Via Turati, 40
20121 Milano (Italia)

Produttore

Miat S.p.A.
Piazza Pasolini, 2
20159 Milano (Italia)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in Ottobre 2024.